Sémiologie de l'épaule

Patrick Boyer

Service d'orthopédie, hôpital Bichat

Articulation scapulo-humérale

Enarthrose: segments de sphères articulées

Rappel anatomique

**La glène est plate, sa concavité est augmentée grâce au bourrelet glénoïdien.
La stabilité est assurée par la capsule ligamentaire et les muscles**

Rappel anatomique

Face postérieure de l'omoplate

Face antérieure : le sous-scapulaire, le biceps, le sus-épineux

Mobilité: abduction

Abduction

Adduction

Retropulsion - antepulsion

Rotations interne et externe

Rotation interne

Grand rond = rétropulsion et adduction

Nerf du grand rond

C6-C7

Nerf sous-scapulaire

C5-C6

Grand pectoral, + grand muscle

Adduction

C6-C8

Grand pectoral

3 chefs: clavulaire, acromiale, spinale

Deltoïde= plus important abducteur, antépulsion

Circonflexe C4-C6

Rotation externe

Nerf sus-scapulaire

C4-C6

Nerf circonflexe

C5-C6

Supra-spinatus

Adducteur

Nerf sus-scapulaire

C4-C6

Biceps brachial

Longue portion: abducteur, rotateur interne

Courte: adducteur

Nerf musculo-cutané C5-C6

Rappel anatomique: le défilé sous-acromial

Coupe des rotateurs tels qu'ils apparaissent en arthrographie

Examen clinique

- **Les mobilités**

- Active
- Passive

Interrogatoire: histoire de la maladie, côté dominant, antécédents

- **Recherche**

- Impotence fonctionnelle
- Points douloureux précis (dg différentiel)
- Tuméfaction, ecchymose (tumeur, fractures)...
- Anomalie neurologique (nerf circonflexe)

- **Signes d'instabilité**

- **Testing de la coiffe des rotateurs**

Ruptures de coiffe

- Rupture du sus-épineux ou rupture de toute la coiffe
- **Douleurs** sous l'acromion au niveau de l'insertion de la coiffe et dans la fosse sus-épineuse
- **Impotence** : **Abduction active incomplète**
 Abduction passive possible
 Impossibilité de retenir le bras en l'abaissant

Épaule pseudo-paralytique

La douleur

- Douleur quasi permanente
- Majorée par l'élévation du bras
- Douleur nocturne empêchant de dormir
- Signes de conflit entre trochiter et acromion
- Il y a de nombreux tests d'examen

Rupture ancienne avec ascension et usure de l'acromion

Le conflit sous-acromial

Inflammation de la bourse

Recherche de la douleur en avant de l'acromion à la palpation et lors des manoeuvres en antépulsion + RI

Arc douloureux

Signe de Neer

Recherche de la douleur en avant de l'acromion

à la palpation

et lors des manoeuvres en antépulsion + RI

Signe de Neer

S. de Hawkins

Recherche de la douleur en avant de l'acromion

à la palpation

et lors des manoeuvres en antépulsion + RI

Signe de Neer

S. de Hawkins

S. de Yocum

Chercher l'atteinte de la RE active

RE coude au corps

RE en abduction

RE nulle s. du clavier

Chercher l'atteinte de la RI active

Test de RI contrariée

Test de Gerber (lift off)

D'autres signes précisent l'atteinte de certains tendons

Sous-épineux

- Amyotrophie fosse sous-épineuse
- RE contrariée (signe de PATTE)

Chercher l'atteinte du tendon long biceps

Douleur dans la coulisse

Palm-up test

Signe de Yagerson

D'autres signes précisent l'atteinte de certains tendons

Rupture du long biceps

- Boule en flexion contrariée

Lésions du tendon du long biceps

Tendon normal

D'autres signes précisent l'atteinte de certains tendons

Sus-épineux

- Amyotrophie fosse sus-épineuse
- Manoeuvre de JOBE

Évolution des ruptures de la coiffe

Pincement de l'espace et ascension de la tête humérale

Arthroscopie

Techniques de réparation de la coiffe

Avivement et réinsertion dans
une tranchée osseuse

Luxations de l'épaule

Déformation caractéristique à l'inspection et à la palpation

- **Tête humérale en avant**
- **Saillie de l'acromion en dehors (s. de l'épaulette)**
- **Vacuité de la glène**
- **Bras en Abduction et en RE**

Complications précoces

Paralysie circonflexe

Lésions vasculaires axillaires

Plexus brachial

Les récurrences sont favorisées par une hyperlaxité

- **Hyperlaxité inférieure : test du sillon (sulcus test)**
- **Laxité antéro-postérieure : tiroir**
- **Test de l'abduction passive**
- **Test de l'appréhension**

Les récurrences sont favorisées par une hyperlaxité constitutionnelle

1 / Hyperlaxité inférieure : test du sillon (sulcus)

Les récurrences sont favorisées par une hyperlaxité constitutionnelle

Abduction inferior stability: ABIS

Les récurrences sont favorisées par une hyperlaxité constitutionnelle

1 / Hyperlaxité inférieure : test du sillon (sulcus test)

2 / Laxité antéro-postérieure : tiroir

Les récurrences sont favorisées par une hyperlaxité constitutionnelle

- Hyperlaxité inférieure : test du sillon (sulcus test)
- Laxité antéro-postérieure : tiroir
- **Test de l'abduction passive**

En cas d'hyperlaxité capsulaire, l'abduction est supérieure à 90°

Normalement limité à 70°

Les récurrences sont favorisées par l'hyperlaxité constitutionnelle

1 / Hyperlaxité inférieure : test du sillon (sulcus test)

2 / Laxité antéro-postérieure : tiroir

3 / Test de l'abduction passive

4 / Test de l'appréhension

La mise en rotation externe lorsque l'épaule est en abduction, crée une appréhension

Autres tests des instabilités antérieures

« Relocation test », RE > 85°

En RE on subluxe l'épaule. Si l'on appuie sur le bras en avant, on replace la tête humérale

Actuellement, nombreux procédés de fermeture de la capsule antérieure par arthroscopie ou abord classique

3/ Transposition de la coracoïde

Procédé de Latarjet
(section du sous scapulaire)

modifié par Bristow
(à travers le muscle)

Fracture de la tête humérale

Douleurs, impotence fonctionnelle, ecchymose brachio-thoracique de Hennequin

Fracture de clavicule:

- Chocs directs,
- Ecchymose
- Douleur, impotence fonctionnelle
- Fragments mobiles

Disjonction Acromio-claviculaire

Disjonction Acromio-claviculaire

Mécanismes

- Choc direct sur l'épaule
- Chute sur le moignon de l'épaule

Sports ++

FIN

Signes cliniques

Saillie de la clavicule

Douleur localisée

Signe de la touche de piano

Stade 1

Entorse simple

Stade 2

**Rupture des ligaments
Acromio-claviculaires**

Stade 3

**+ Conoïde et
trapézoïde**