Pharmacologie-

- **Pharmacologie générale P2**
- Pharmacologie des grandes classes médicamenteuses (antidiabétiques-hormones-antibiotiques, antiviraux, antihypertenseurs, anticancéreux, médicaments du SNC, antiarythmiques...en D3.
- **Thérapeutique en D4**

Pharmacologie générale

Etude du médicament:

- Classes chimiques: pharmacochimie
- Pharmacodynamie (effets attendus) et mode d'action
- Métabolisme et élimination: mode d'administration, périodicité, pharmacocinétique
- Effets secondaires et interactions médicamenteuses: Iatrogenèse
- Grandes indications

Récepteurs des médicaments et action pharmacologique

Cours de Pharmacologie- P2

F. Calvo- 26/11/2007

Les médicaments

- Un médicament est une **substance administrée** pour corriger, modifier ou restaurer une fonction affectée de l'organisme.
- Un médicament est une **molécule**, parfois un élément (ions...) **qui interagit avec une cible** moléculaire, c'est-à-dire avec un récepteur biologique. Ces interactions supposent une reconnaissance mutuelle des deux partenaires.
- La liaison du **médicament modifie les propriétés de la cible**, ce qui conduit à une réponse de la cellule. Ceci est à l'origine des effets bénéfiques et indésirables d'un médicament.

Les médicaments

- On compte environ **3000 substances** utilisées comme médicaments mais uniquement **500 cibles** (environ **100 000 protéines**).
- Les deux classes de cibles les plus importantes sont les **récepteurs membranaires des médiateurs** (45% des cibles actuelles) et les **enzymes** (28%). Les **canaux ioniques** (5%) et les **récepteurs nucléaires** (2%) sont d'autres cibles potentielles des médicaments.

Exemples d'actions thérapeutiques

- Inhibition de l'HMG CoA reductase
hypocholestérolémiant
- Blocage de la cyclo-oxygenase catabolisant l'acide arachidonique **Anti-inflammatoires**
- Blocage du cycle d'oxydo-réduction de la vitamine K **Anticoagulants**
- Inhibition de l'enzyme de conversion de l'angiotensine **Anti-hypertenseurs**
- Anti-mitotiques **Chimiothérapies**
- Inhibiteurs du recaptage de la sérotonine
Antidépresseurs

Les protéines sont la cible de nombreux médicaments

L'état actuel

- La connaissance du génome (40 000 gènes)
- Le décryptage du protéome (> 100 000 protéines)
- L'association entre des protéines cibles et des maladies

On considère que les médicaments agissent par interaction avec 4 types de protéines régulatrices dans les cellules humaines:

- Enzymes (p.ex. l'Aspirine inhibe une enzyme, la cyclooxygenase).
- Protéines de transport (p.ex. le Prozac inhibe le transporteur de la sérotonine).
- Protéines des canaux ioniques (p.ex. les anesthésiques locaux inhibent les canaux Na).
- Protéines récepteurs (p.ex. le Zirtec, un anti-allergique, bloque le récepteur H1 de l'histamine)

Récepteurs des médicaments

- **les récepteurs canaux ioniques** sont des récepteurs de membrane associés à un canal ionique Ex: le récepteur de l'acetylcholine- transmission neuromusculaire
- **Les récepteurs couplés aux protéines G**: après activation de nombreux signaux de transduction sont activés. Des hormones peptidiques et plusieurs neurotransmetteurs utilisent cette signalisation.
- **les récepteurs Tyrosine kinase** contiennent une activité enzymatique intrinsèque dans leur domaine intracellulaire. Après activation par leur ligand le récepteur TK va entraîner une cascade de phosphorylation - (insuline, EGF, VEGF...)
- **Les récepteurs intracellulaires** régulent la transcription génique. En se liant au récepteur les hormones stéroïdes sont transloquées au noyau et régulent la transcription.

Médicament de substitution = Remplacement d'une substance nécessaire à l'organisme

- Défaut de synthèse : **insuline** chez le patient diabétique, **dopamine** (L dopa) dans la maladie de Parkinson, **facteurs VIII ou IX** chez l'hémophile
- Défaut d'apport : **vitamine D** (rachitisme), **vitamine B12** (anémie de Biermer).
- Défaut physiologique de synthèse : **oestrogènes** après la ménopause.

Médicaments interagissant avec le métabolisme d'une substance endogène

- **Inhibition de la synthèse de l'angiotensine II** à partir de l'angiotensine I (= inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- **Inhibition de la synthèse du cholestérol** par inhibition de l'HMG-CoA réductase (hydroxy methyl glytaryl Co-enzyme A reductase) qui assure la synthèse de l'acide mévalonique précurseur du cholestérol (= mécanisme d'action principal des statines).
- **Inhibition des vitamines K réductases** aboutissant au blocage du cycle d'oxydo-réduction de la vitamine K (base du mécanisme d'action des anti-coagulants oraux).

Médicaments qui interagissent avec les cibles de substances endogènes

Développement d'agonistes et antagonistes

- Agonistes-antagonistes beta-adrénergiques

Agonistes beta 1 et 2 : isoprénaline, adrénaline

Agoniste beta 1 : dobutamine, noradrénaline, dopamine

Agonistes beta 2 préférentiels : salbutamol, terbutaline, salmeterol

Antagonistes beta - bloquants

- Agonistes-antagonistes dopaminergiques (neuroleptiques)
- Antagonistes des récepteurs H1 et H2 de l'histamine
- Morphiniques : agonistes des récepteurs aux enképhalines
- Curares : blocage de la transmission neuro-musculaire

Médicaments interagissant avec les canaux membranaires ou des systèmes de transport ionique

- Anti-arythmiques de classe I, anesthésiques locaux (xylocaïne), bloqueurs des canaux calciques, potassiques, digitaliques (= inhibiteurs de l'ATPase membranaire Na K), inhibiteurs de la pompe à protons au niveau gastrique etc...

Interaction avec bactéries/virus parasites/champignons

- Inhibition de synthèse d'un constituant indispensable à leur développement ou à leur survie
- Beta-lactamines, inhibition de synthèse de la paroi bactérienne,
- quinine, chloroquine : inhibition du cycle de maturation du plasmodium falciparum

Types de récepteurs membranaires et nucléaires impliqués dans la réponse aux médicaments

Récepteurs de type canal ionique

(a)

The electrogenic Na^+K^+ ATPase establishes the membrane potential.

(b)

Ions tend to move down their electrochemical gradient across the polarized membrane.

Récepteurs couplés à des canaux ioniques

Récepteurs des neurotransmetteurs: p ex: serotonine, acetyl choline

Liaison du ligand au récepteur > ouverture du canal > influx ionique > Cascade d'évènements en aval

Médicaments inhibiteurs: barbituriques, antidépresseurs

Récepteurs couplés à des protéines G

Recept couplé G 0.mov

Recept couplé G prot1.mov

Recept couplé effecteur2.mov

Recept couplé PKA4.mov

Recept couplé Ad Cycl3.mov

Recept couplé PLC.mov

Noradrénaline

- ① Epinephrine binds to its specific receptor.

- ② The occupied receptor causes replacement of the GDP bound to G_s by GTP, activating G_s .

- ③ G_s (α subunit) moves to adenylyl cyclase and activates it.

- ④ Adenylyl cyclase catalyzes the formation of cAMP.

- ⑤ PKA is activated by cAMP.

cyclic nucleotide phosphodiesterase

5'-AMP

- ⑥ Phosphorylation of cellular proteins by PKA causes the cellular response to epinephrine.

- ⑦ cAMP is degraded, reversing the activation of PKA.

Inactive PKA

Regulatory subunits:
empty cAMP sites

Catalytic subunits:
substrate-binding
sites blocked by
autoinhibitory
domains of R subunits

Regulatory subunits:
autoinhibitory
domains buried

Active PKA

Catalytic subunits:
open substrate-
binding sites

(a)

Récepteurs liés à des enzymes

Recept Tyr kinase.mov

Recepteurs liés à des enzymes

Recepteurs tyrosine kinases

Exemples- récepteurs des facteurs de croissance : FGF, PDGF, Insulin, IGF-1, CSF

La liaison du ligand au RTK----activation de l'activité TK-----autophosphorylation-----liaison de la protéine d'activation de la GTPase ou de la PI3 kinase ou de la phospholipase----Activation de la PKC et/ou Ras---activation de la MAPKKK----activation de la MAPKK---Activation de la MAPK----c-Jun---activation de la transcription

Receptor serine/threonine kinases:

Exemples des récepteurs de la famille TGF- β

IRS: Insuline
receptor substrate

INSULINE

Pancreas endocrine et exocrine:

Ilots de Langherans endocrines:

Cellules Alpha: glucagon

Cellules Beta: Insuline (au centre)

Cellules Delta:somatostatine

**Les ilots sont très vascularisés
permettant le transfert rapide
sanguin des hormones. Ils sont
innervés par les neurones
Parasympathiques et sympathiques.**

INSULINE

Structure de l'Insuline:

C'est une petite protéine d'environ 6000 Daltons. Elle est composée de deux chaînes réunies par des ponts disulfures (chaîne A en bleu et chaîne B en vert)

Sa structure est extrêmement bien conservée à travers les espèces (les insulines animales -porcines, extraite du pancréas- continuent à être utilisées chez les patients)

INSULINE

Synthèse de l'insuline:

L'insuline est synthétisée par les cellules B, sous la forme d'une protéine linéaire la Pré-pro-insuline, maturée dans le RE en proinsuline par clivage enzymatique du peptide signal.

La proinsuline comporte 3 domaines, aminoterminal A, carboxyterminal B et un peptide intermédiaire le peptide C qui va être excisé par des endopeptidases spécifiques dans le RE, les trois protéines vont migrer dans le golgi, s'accumuler et être libérées par exocytose après stimulation appropriée

INSULINE

Contrôle de la sécrétion d'insuline

L'INSULINE est sécrétée en réponse à l'élévation des concentrations sanguines de glucose, pour faciliter l'entrée du glucose dans les cellules. D'autres signaux neurologiques ou nutritionnels stimulent sa sécrétion (alimentation, AA, AG...)

Le Glucose est transporté dans la cellule B par diffusion facilitée par le transporteur de glucose.

- **Les concentrations élevées de glucose dans la cellule B entraînent une dépolarisation de la membrane et un influx calcique, qui déclencher l'exocytose des granules de sécrétion d'insuline.**
- **D'autres mécanismes de sécrétion indépendants du flux calciques existent .**

INSULINE

Stimulation de la sécrétion d'insuline:

La concentration normale de glucose sanguin est de 4 à 5 mMoles chez l'homme associée à des taux très faibles d'insulinémie.

La perfusion de glucose aboutit immédiatement à un pic d'insulinémie libéré par les cellules, suivi d'une chute transitoire (déplétion des stocks), et d'une réascension secondaire liée à la synthèse de novo d'insuline suggérant un effet transcriptionnel du glucose sanguin.

Structure de l'insuline:

En solution, l'insuline a tendance à se dimériser ou former des hexamères en présence de zinc (propriété utilisée pour former des formes retard). Les dimères et hexamères diffusent difficilement dans le sang et sont donc des formes retard. A l'inverse de nouvelles insulines de synthèse existent comme l'insuline LISPRO dans laquelle une simple interversion de PRO et LYS ne modifie pas la liaison au récepteur mais empêche la formation de dimères et d'hexamères.

INSULINE

Le récepteur de l'insuline et mécanisme d'action:

C'est un récepteur membranaire de la famille des récepteurs Tyrosine kinase, composé de deux sous unités alpha et deux sous unités beta. La liaison de l'insuline va entraîner l'auto phosphorylation de la chaîne beta et la phosphorylation d'autres protéines intracellulaires. La mieux étudiée est la protéine IRS-1 qui va recruter et activer d'autres enzymes.

L'insuline facilite l'entrée de de glucose dans le muscle, le tissus adipeux , et d'autres tissus par les transporteurs d'hexose dont le représentant majeur est le GLUT4. Le foie et le cerveau utilisent d'autres transporteurs indépendants du récepteur de l'insuline

L'insuline stimule le le stockage hépatique de glucose sous forme de glycogène. L'insuline active l'hexokinase hépatique qui phosphoryle le glucose et inhibe la G6 phosphatase permettant son trappage. Elle stimule les enzymes de synthèse de glycogène (PFK et Glycogène synthase). L'insuline diminue les taux sanguins de glucose et son effet cesse dès que la glycémie baisse. Les cellules utilisent alors les AG comme source d'énergie à l'exception des neurones.. En l'absence d'insuline la synthèse de glycogène est remplacée par sa dégradation. Cette dégradation est également sous la dépendance du Glucagon.

L'insuline augmente la synthèse d'acides gras par le foie. Dès que la synthèse de glycogène dépasse un niveau (>5% masse hépatique) celle-ci ralentit au profit d'autres voies métaboliques comme la synthèse d'AG qui sont libérés sous forme de lipoprotéines qui vont être captés par d'autres tissus dont les adipocytes pour synthétiser les triglycérides.

L'insuline inhibe la dégradation des lipides dans le tissu adipeux en inhibant la lipase intra cellulaire qui hydrolyse les triglycérides.

L'insuline facilite l'entrée du glucose dans les adipocytes ou il permet la synthèse de glycérol utilisé avec les AG hépatiques pour former les triglycérides.

Globalement l'insuline a un rôle d'épargne lipidique, favorisant l'oxydation périphérique du glucose plutôt que celle des AG pour fournir de l'énergie, stimulant indirectement l'accumulation de graisses dans les adipocytes.

Insuline

	DID	DNID
Age d'apparition	< 30 ans	➤ 40 ans
Antécédents familiaux	Inhabituels	Habituels
Poids	Non obèse	Obèse
Acidocétose	Oui	Non
Traitement Insulinique	Oui	Rare et tardif
Prévalence	0,5%	5% en augmentation
Association avec HLA	Oui	Non

Profils quotidien du glucose et de l'insuline plasmatiques chez des volontaires sains (n=12)

Préparations d'Insuline (1)

- **Insulines immédiates: séquences modifiées empêchant la dimérisation: peuvent être administrées immédiatement avant ou même après le début du repas**
 - Insuline lispro
 - Insuline aspart
- **Insulines à courte durée d'action: ou neutre et soluble, administrée 1/2h avant le repas, durée d'action de 8h**
 - Actrapid, humuline S
 - Insuline bovine ou porcine

Préparations d'Insuline (2)

- **Insulines intermédiaires et à longue durée d'action: complément indispensable à la couverture quotidienne en complément des insulines rapides (insulines isophane)**
- **Insulines biphasiques: mélange d'insuline immédiate et d'insuline à longue durée d'action**
- **Nouvelles préparations susceptibles de couvrir sur 24h les besoins en association avec les insulines immédiates (Ins-Glargine, Ins-Determir)**

Estimation des consommations d'insulines

	Insulin consumption			
	Worldwide	UK	Canada	Italy
Insulin type				
Soluble	26%	23%	26%	26%
Premixtures	39%	51%	31%	39%
Basal (NPH, IZS)	35%	26%	43%	35%

L'administration d'insuline ne reproduit pas les variations physiologiques en raison des problèmes de résorption et de biodisponibilité

Surveillance du traitement insulinique

- Glycémie capillaire au doigt > 3 fois /j
- HbA1c (/2mois)
- Adaptation des doses
- Education du patient qui devient son thérapeute
- Carnet de surveillance

Extracellular space

EGF-binding domain

EGF

Tyrosine kinase domain

EGF-binding site empty; tyrosine kinase is inactive.

Binding of EGF activates tyrosine kinase.

Tyrosine kinase is constantly active.

Normal EGF receptor

ErbB protein

TYROSINE KINASE INHIBITORS

IMATINIB (GLIVEC®)

GEFINITIB (IRESSA®)

TARCEVA®

PTK 787

Récepteurs nucléaires

Récepteurs Nucléaires

Exemples

- Corticostéroïdes
- Minéralo-corticoïdes
- Stéroïdes sexuels
- Vit D
- H. Thyroïdienne
- NO

Liposolubilité

The nuclear receptor superfamily

Steroid Receptors

GR	<i>glucocorticoid</i>
MR	<i>mineralcorticoid</i>
PR	<i>progesterone</i>
AR	<i>androgen</i>
ER	<i>estrogen</i>

RXR Heterodimers

TR α,β	<i>thyroid hormone</i>
RAR α,β,γ	<i>all-trans RA</i>
VDR	<i>1,25-(OH)$_2$-VD$_3$</i>
PPAR α,β,γ	<i>eicosinoids</i>
EcR	<i>ecdysone</i>

Dimeric Orphan Receptors

RXR (usp)	<i>9-cis RA</i>
COUP/ARP	?
HNF-4	?

Monomeric Orphan Receptors

NGFI-B (CEB-1')	?
ELP / SF-1 (Ftz-F1)	?

Activation of steroid and non-steroid nuclear receptors

Non-steroid receptors

Domain structure of nuclear hormone receptors

Transcriptional repression and activation by nuclear receptors

Estrogen Receptors

Estrogen target cell
(e.g., breast, uterine lining,
liver, etc.)

Non-target cell
(contains no
estrogen receptor)

Estrogen

Tamoxifen

Estrogen
receptor

© 2000 by American Society of Breast Surgeons

Estrogen Receptors Trigger Gene Activation

Estrogen-Induced Changes in Cell Behavior

Mode of Action of Estradiol

Estradiol

AF1 and AF2 = Transcription activation function

ER = Estrogen receptor

ERE = Estrogen response element

Wakeling AE et al. *Endocr Relat Cancer*. 2000;7:17-28.

Activation de la synthèse de protéines spécifiques

Activation de la croissance

Antagonisme par la liaison des anti-hormones