Le nouveau-né

Sémiologie

Y Aujard
service de néonatalogie
hôpital Robert Debré

Le nouveau-né: 800 000/an

- J0 à J 28
- Poids : 3300 g [2800- 4000]
- Taille : 50 cm [47 – 54]
- Périmètre crânien : 35 cm [33 -37]=
T/2+10
- Poids du placenta : PN/6
- Fréquence respiratoire : 30-50/mn (<60)
- Fréquence cardiaque : 120-150/mn (<
200)
- PA : 80/50 ±10 mm Hg

Adaptation à la naissance

- respiration: placenta $\Rightarrow$ poumons
 - premier cri: expansion alvéolaire
 - résorption du liquide pulmonaire
 - chute des Résistances Artérielles Pulmonaires
 - PO 2 : 35- 40 $\nearrow$ 90 mm Hg
- **↪ score d'Apgar ▶**
- *cœur:*
 - *circulation droite $\Rightarrow$ circulation gauche*
 - *fermeture du canal artériel*
- *régulation glycémique et risque hypothermie*

Score d'Apgar

- normal ≥ 7
- ascendant = bonne adaptation (3/6/8)
- stagnant = mauvais

	0	1	2
COLORATION	CYANOSE/PALE	PALE/ROSE	ROSE
CŒUR	0	< 100	> 100
RÉACTIVITÉ	0	Légère	Cri
RESPIRATION	0	Irrégulière	Régulière
TONUS	Nul	léger	Bon, flexion

Adaptation à la naissance

- *respiration: placenta* ⇒ *poumons*
 - *premier cri: expansion alvéolaire*
 - *résorption du liquide pulmonaire*
 - *chute des Résistances Artérielles Pulmonaires*
 - *PO 2 : 35- 40 ↗ 90 mm Hg*↳ *score d'Apgar* ▶▶
- **cœur:**
 - *circulation droite* ⇒ *circulation gauche*
 - *fermeture du canal artériel*
- **régulation glycémique et risque hypothermie**

Examen initial en salle de naissance

- perméabilité des orifices
 - Choanes
 - œsophage (test de la seringue ++)
 - anus
- FC et FR régulières et dans les normes
- Coloration et réactivité
- Absence de souffle ; pouls tous perçus
- Absence d'ictère et de pâleur

Nouveau-né : classification

- à terme
- post mature AG > 42 semaines
- prématuré AG < 37 semaines
- eutrophe ou
- hypotrophe : PN < 10 è percentile
- macrosome : PN > 90 è percentile

Le nouveau-né

Détermination de l'âge gestationnel (terme)

- Mère : écho précoce + date dernières règles
- Critères somatiques :
 - peau : mamelon, lanugo
 - Cartilage des oreilles
 - plis plantaires
 - organes génitaux externes
- Critères neurologiques :
 - réflexes archaïques : Moro, redressement, grasping, marche automatique,..
 - tonus axial et périphérique ⇒ « grenouille »
 - EEG

Eutrophe/ hypotrophe/macrosome

Sémiologie neurologique néonatale

SEMAINE		28	30	32	34	36	38	40
TONUS PASSIF	POSTURE
	TALON-OREILLE
	ANGLE-POPLITE	150°	130°	110°	100°	100°	90°	80°
	ANGLE PIED-JAMBE			40-50°		20°	enfant à terme
	FOULARD
RETOUR EN FLEXION DE L'AVANT-BRAS	0	0	0	faible	inibé	rapide et non inibé		
TONUS ACTIF	FLÉCHISSEURS NUQUE	0	0	±	tête ne passe pas le tronc	tête tombe en avant	tête se maintient quelques sec. verticalement	maintient de la tête ++
	EXTENSEURS NUQUE	0	0	±	+	tête tombe en arrière		
	REDRESSEMENT M.I.	0	±	+ transitoire	+	++	+++	
	REDRESSEMENT TRONC	0	0	0	+ transitoire	+	++	

REFLEXES ARCHAÏQUES	POINTS CARDINAUX	réponse lente et imparfaite		réponse complète et plus rapide	réponse complète, rapide, durable.		
	MORO	extension bras et ouverture des mains		réflexe complet avec abduction des bras et cri			
	GRASPING	+ doigts	+ bras	épaule + dos		enfant soulevé du plan du lit	
	EXRENSION CROISÉE			abduction	indifférent	adduction	
	MARCHE			ébauche sur pointes des pieds	bonne sur pointes des pieds	excellente : préma : pointe puis talon terme : talon puis plante	
					36	38	40
MORPHOLOGIE	NODULES MAMAIRES				2 mm	4 mm	7 mm
	CRETES PLANTAIRES				1/3 ant.	2/3 ant.	3/3 ant.
	CARTILAGE DES OREILLES				0	+	+
	POST-MATURITE						

Hypertonie périphérique contrastant
avec une hypotonie
axiale (nuque)

nouveau-né, YA- nov 2007

Acquisition inverse des réflexes archaïques, de haut en bas

A l'inverse du tonus :

- Succion
- Points cardinaux
- Grasping (MS)
- Moro : extension, retour en flexion,
(cris)
- Allongement croisé
- Marche automatique

SUCCION-GRASPING

nouveau-ne, YA- NOV 2007

Réflexe de MORO

Moro : les 3 temps

ALLONGEMENT CROISE

REDRESSEMENT ET MARCHE AUTOMATIQUE

Le nouveau-né : conditions d'examen

- Mise en confiance mère /enfant : nouveau-né sur les genoux de sa mère , prise de contact « oral » et oculaire.
- Dialogue constant : lui parler
- Installation « décontractée » sur table d'examen: demi assis, de face, nuque soutenue
- Evaluation du contact, de la réactivité et de la motricité spontanée
- Examen physique non agressif et progressif

Nouveau-né : examen général

- croissance depuis sortie ; prise des bib.; sommeil
- forme du crâne; ictère ?
- foie, rate ?
- palpation des fémorales = radiales
- auscultation cardiaque et pulmonaire (trans linge)
- Organes génitaux : masc, féminins ou ?
- tonus axial et périphérique ; réactivité , suivi oculaire
- Noter les anomalies mineures cf fossette sacrée, bosse séro-sanguine, angiome, tache mongoloïde,..
- stabilité des hanches (à la fin)
- Profil psychologique de la mère
 - ↳ carnet de santé

nouveau-né, YA- nov 2007

Recherche d'une hanche luxable

- Ortolani / **Barlow**
- Hanche séparée
- poussée postérieure
- adduction de la tête fémorale
- sensation de ressaut

Ancien prématuré

- **AG < 37 semaines**
- **suivi prolongé en consultation hospitalière**
- **surveillance neurologique**
- **surveillance somatique**
 - **croissance**
 - **RGO**
 - **alimentation**
 - **vaccins,..**

Ancien hypotrophe=RCIU

- $PN < 10^{\text{ème}}$ percentile pour le terme (AG)
- sévère si $PN \leq 3^{\text{ème}}$ percentile
- homogène (symétrique), $\simeq PC // PN$
 - ↳ même surveillance que l'ancien prématuré
- Si PC petit, $\nearrow$ risque mauvais pronostic neurologique

Nouveau-né à terme: sémiologie des détresses vitales

Détresse respiratoire

- FR > 60/mn
 - Régularité , ou non, du rythme respiratoire
 - Signes de lutte: **Score de Silverman:**
 - 5 signes côtés de 0 (Normal) à 2 (très pathologique)
 - geignement, balancement des ailes du nez, tirage intercostal, balancement thoraco-abdominal, entonnoir sous xyphoïdien
 - Auscultation pulmonaire + Rx
 - Saturation transcutanée en O₂ ++
- ∇ ≠ obstacle: nez, langue, larynx

Détresse respiratoire : signes de décompensation

- Rythme irrégulier
 - pauses $\Rightarrow$ apnées $\Rightarrow$ arrêt cardiorespiratoire
- Saturation transcutanée en O₂ ++
 - < 80 % sous air
 - < 90 % sous O₂
- PCO₂ (mm Hg)
 - $\approx$ 60 en situation aiguë
 - $\approx$ 70 en situation chronique (hypercapnie permissive)

Pathologies pulmonaires (doc)

- Infection
- Retard de résorption
- Inhalation de liquide amniotique
- Pneumothorax
- Malformation dont hernie diaphragmatique
 - ↳ toutes les DR ne sont pas d'origine pulmonaire
- Maladie des membranes hyalines : exceptionnelle à terme (diabète)

Infection pulmonaire

Pneumothorax

nouveau-né, YA- nov 2007

Sémiologie cardiologie-vasculaire

- $80 < FC < 200$ /mn
- TA > 50 mm Hg(membre sup.)
- ✂ ↗ temps recoloration cutané > 3 sec
- insuffisance cardiaque :
 - ↗ foie ; ↗ FC ; $45 < RCT < 0.55$
 - ↳ coarctation aortique ; myocardiopathie; canal artériel persistant
- choc, non spécifique
- trouble du rythme (TSV): ECG
- surcharge volémique
- Rx poumons, Echo coeur++, ECG

Cardiomégalie

nouveau-né, YA- nov 2007

Détresse neurologique

- contact; suivi oculaire
 - hyporéactivité ; hyperexcitabilité
 - hypotonie ou hypertonie axiale et périphérique
 - Mouvements anormaux:
 - cloniques, toniques, mixtes ou atypiques
 - dissociation électro-clinique (1/3, 1/3, 1/3)
- ∇ ≠ trémulations : s'arrêtent dans la main

Convulsions néonatales causes (doc)

- Infectieuses
 - méningite, surtout bactérienne
 - Herpès néonatal
- Métabolique :
 - hypoglycémie ++ ; hypocalcémie
 - complexe (M métabolique)
- Anoxo-ischémique (SFA)
- Traumatique
- Hémorragique

Infections à terme. Clinique

- précoces(en maternité) ou tardives, à la maison
- détresse respiratoire
- troubles hémodynamiques : ↗ FC, TRC ↗
- ictère < H 24 ou anormalement persistant
- purpura, ↗ foie, rate
- hypotonie, hyporéactivité
 - ↳ mauvaises sensibilité et spécificité
- Bilan biologique

Ictères : clinique

- apparition < ou > H 24
- extension et intensité; taux à la sortie de maternité (Bilirubine transcutanée)
- signes associés
 - ↳ foie, rate ; purpura ; pâleur
- risque neurologique: ictère nucléaire (bilirubine libre)
- signes de conjugaison : urines foncées, selles colorées
- surveillance biologique: BT/ BC/ BNL(BIE)
- recherche cause(s)

Ictère : traitement Photothérapie (doc)

nouveau-né, YA- nov 2007

Nouveau-né et douleur

- Douleur spontanée
 - fracture
 - traumatisme obstétrical
 - viscérale cf entérocolite, méningite
- Evaluation sur grille objective (EDIN)
 - 5 paramètres cotés 0, 1, 2, ou 3
 - visage / corps / sommeil / relation / réconfort
 - score maximum 15

n	Proposition
	<ul style="list-style-type: none"> • Visage détendu 0 • Grimaces passagères : froncement des sourcils1 • , lèvres pincées, plissement du menton, tremblement du menton1 • Grimaces fréquentes, marquées ou prolongées 2 • Crispation permanente ou visage prostré, figé ou visage violacé 3
	<ul style="list-style-type: none"> • Détendu 0 • Agitation transitoire, assez souvent calme 1 • Agitation fréquente mais retour au calme possible 2 • Agitation permanente : crispation des extrémités et raideur des membres • ou motricité très pauvre et limitée avec corps figé 3
œil	<ul style="list-style-type: none"> • S'endort facilement, sommeil prolongé calme 0 • S'endort difficilement 1 • Se réveille spontanément en dehors des soins et fréquemment, 2 • sommeil agité 2 • Pas de sommeil 3
n	<ul style="list-style-type: none"> • Sourire aux anges, sourire réponse, attentif à l'écoute 0 • Appréhension passagère au moment du contact 1 • Contact difficile, crie à la moindre stimulation 2 • Refuse le contact, aucune relation possible. 3 • Hurllement ou gémissement sans la moindre stimulation 3
port	<ul style="list-style-type: none"> • N'a pas besoin de réconfort 0 • Se calme rapidement lors des caresses au son de la voix ou à la succion 1 • Se calme difficilement 2 • Inconsolable, succion désespérée 3

Grille EDIN de confort et de douleur chez le nouveau-né (doc)

Nouveau-né. Conclusions

- vulnérabilité+
- contexte maternel et familial
- instabilité des premières heures et premiers jours
- compétence neuro-sensorielle
- surveillance métabolique
- évolution nutritionnelle et digestive
- risque infectieux virus et bactéries